



### തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 37/2018(73), ചൊമ്മാഴ്ച

തീയതി 11.09.2018

### പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഇതു ബുള്ളറ്റിനിലെ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണ്.

**കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി:** കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരയിൽ 0.5 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാവനില 31.4 മുതൽ 32.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാവനില 21.0 മുതൽ 23.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേ 88 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേ 51 മുതൽ 65 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 2.0 മുതൽ 2.2 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 7.6 മുതൽ 10.3 മണിക്കൂറും, ബാഷ്പീകരണം ദിനം പ്രതി 3.4 മുതൽ 4.2 മിലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	12.09.2018	13.09.2018	14.09.2018	15.09.2018	16.09.2018
മഴ (മിലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23	23	23	23	23
മോബൈൽ ഫോൺ (കെട്ട)	5	5	5	5	5
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേ (%)	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേ (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	006	006	006	006	006
കാറ്റിന്റെ ദിന (ഡിഗ്രി)	290	290	290	290	290

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വരും 5 ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.

#### കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാവലക്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	പാലുറയ്ക്കുന്ന പരുവം	ബാക്കടീരിയൽ ഇല കരിച്ചൽ	നെല്ലിലെ ബാക്കടീരിയൽ ഇല കരിച്ചൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പച്ച ചാണകം 200 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്ത് 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്. 10 ദിവസം ഇടവിട്ട് 2-3 തവണയെക്കിലും തളിക്കണം.
വാഴ	കുലച്ച പരുവം	ഇലപുള്ളി രോഗം	വാഴയിൽ കാണുന്ന ഇലപുള്ളി രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കുക. 2 ആഴ്ചക്കു ശേഷമും രോഗത്തിനു കുറവില്ലെങ്കിൽ 2 മി.ലി ഹെക്സാക്കോണാസോൾ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി പ്രോപിക്കാനാസോൾ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ പശ് ചേർത്ത് ഇലയുടെ അടിയതക്കു വിധം കുളിർക്കുക തളിക്കുക.
കുറുമുളക്	-	ദ്രോവാട്ടം	കുറുമുളകിൽ ദ്രോവാട്ട് രോഗം കാണാൻ ടെന്യുണ്ട്. രണ്ടു കിലോ ദ്രോവാട്ടേക്കാഡാർഡ് 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കുട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇളർപ്പി നിലനിൽക്കുത്തെക്കു വരും രണ്ടുച്ചത്തേതയ്ക്ക് വയക്കുക. ഇതു മിസ്റ്ററത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ പീതം ഓരോ കുറുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക. രോഗം കുടുന്ന പക്ഷം 1% പീരുമുള്ള മേഖലയോ മിസ്റ്ററത്തോ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് പ്രൈറ്റുംസർസ് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിഡോക്സൈറ്റീഡീസെറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മണ്ണു കുതിരത്തെക്കു വരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
മുഗസംരക്ഷണം	<ul style="list-style-type: none"> <li>എലിപ്പിനിക്കും പരാദ രോഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.</li> <li>ശരീരത്തിലെ കുടുംബക്കുന്ന മുറിവുകൾക്ക് അടിയന്തരം ശ്രദ്ധ നൽകുക.</li> <li>കനുകാലി ഷഡ്ല്യും പരിസരവും ശുചിയായി സുക്ഷിക്കുക.</li> </ul> <p>(സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മണ്ണുത്തി)</p>		

